

ASSOCIAZIONE PUGLIESE PER LA RETINITE PIGMENTOSA

SUGGERIMENTI TERAPEUTICI RACCOMANDATI PER TUTTI I PAZIENTI

Protocollo terapeutico secondo gli studi clinici di Berson e Laties (U.S.A.)

1) AROVIT gocce (Bayer)

- Due gocce in poca acqua a pranzo.

2) ESAPENT o ESKIM o SEACOR capsule

- Una capsula dopo pranzo.

Questa terapia va eseguita senza interruzioni per due anni.

Prima di iniziarla e dopo il primo e secondo anno è opportuno controllare la funzionalità epatica: se questa è danneggiata la terapia va sospesa.

Dopo i primi due anni la somministrazione di Arovit va continuata, mentre gli omega 3, di cui al punto 2 (esapent etc.) possono essere assunti con la dieta a base di pesce fresco (sarda, alice, sgombro, cefalo, tonno, aringa, salmone, merluzzo etc.) possibilmente non fritto :

- 100 gr. almeno due volte la settimana.

Note: questa terapia è utile soprattutto per i pazienti affetti da Retinite Pigmentosa con riduzione del campo visivo periferico, che abbiano ancora un campo visivo centrale non danneggiato ed un visus non inferiore a 1/10.

Nota Bene : I farmaci indicati richiedono la prescrizione medica.

Vanno seguite le avvertenze e le controindicazioni segnalate nel foglietto illustrativo di ciascun farmaco.

30.10.2008

Prof. Matteo Bracciolini - Oculista